

SANTÉ ORALE : CANCERS ORAUX CAUSÉS PAR HPV

FOCUS SANTÉ ORALE ET PAPILLOMAVIRUS


Les papillomavirus humain- autrement dit HPV- sont un virus faisant partie des infections sexuellement transmissibles (IST) lors des relations sexuelles avec ou sans pénétration.

Si la grande majorité des infections HPV sont bénignes, certains de ses génotypes (ex : 16 et 18) sont considérés à haut risque et sont responsables d'un grand nombre de cancers tel que le cancer de l'oropharynx qui avait jusqu'à présent pour principales causes reconnues : le tabac et l'alcool.

Désormais, il est clairement établi que la pratique du sexe oral peut être un des modes de transmission du HPV et qu'il peut être par conséquent un des facteurs étiologiques pouvant participer au développement de ces cancers.

La santé orale est un sujet pluriprofessionnel. Elle permet aux individus "d'effectuer les fonctions essentielles telles que manger, respirer, parler et englobe des dimensions psychosociales, comme la confiance en soi, le bien-être et la capacité à créer des liens sociaux".

LOCALISATION



Source : IMAIOS

CHIFFRES CLÉS

80% des femmes et hommes sexuellement actifs sont exposés à un risque d'infection HPV au cours de leur vie et ce quel que soit l'âge.

En 2017, le HPV a été responsable de 1700 nouveaux cas de cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) dont 35% étaient des cancers de l'oropharynx

Les URPS d'Occitanie s'unissent pour vous sensibiliser sur les gestes de prévention à adopter pour limiter le risque de développer un cancer oropharyngé lié à une infection HPV.

FOCUS VACCINATION

Existante depuis plus de 10 ans, la vaccination HPV a su prouver son efficacité en prévenant jusqu'à 90% les lésions précancéreuses et/ou cancers causés par une infection HPV.

Qui peut se faire vacciner ? Depuis le 1er janvier 2021, il est recommandé de faire vacciner avant le début de la vie sexuelle, les filles et les garçons à partir de 11 ans. Plus le vaccin est réalisé tôt plus la protection donnée par ce dernier sera proche de 100%.

Âge	Nombre de doses
De 11 à 14 ans	2 doses à 6 mois d'intervalle
Rattrapage de 15 à 19 ans	3 doses à 0 mois (M), à 1 ou 2 M (en fonction du vaccin administré), à 6 M

Cas particuliers :

- Rattrapage du vaccin HPV possible jusqu'à 26 ans pour les hommes ayants des rapports sexuels avec d'autres hommes. Le schéma des 3 doses sera appliqué.
- Vaccination possible dès 9 ans jusqu'à 19 ans pour les filles et les garçons candidats à une transplantation d'organe solide.

Le Président de la République a annoncé la mise en place d'une campagne vaccinale HPV pour tous les élèves de 5ème à partir de la rentrée de septembre 2023. La 1ère injection s'est déroulée courant novembre 2023 et la 2nde injection s'effectuera à la mi-mai 2024. D'ici 2030, l'objectif est de couvrir 80% de la population.

Quels sont les vaccins HPV ? Il existe 2 vaccins :

- Le Cervarix[®] qui est à utiliser uniquement chez les filles si le schéma vaccinal a été initié avec ce vaccin
- Le Gardasil[®] qui est injecté chez les filles et les garçons si le schéma vaccinal a été initié avec ce vaccin et pour toute nouvelle vaccination filles et garçons

Le remboursement du vaccin HPV

Âge	Assurance maladie (AM)	complémentaire santé
Jusqu'à 19 ans	Remboursement à hauteur de 65 %	Le reste à charge peut être remboursé par la complémentaire santé

Pas de reste à charge	<ul style="list-style-type: none">→ pour les personnes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS)→ Dans certains centres de vaccination municipaux ou départementaux conventionnés avec l'AM→ Dans le cadre de la campagne vaccinale HPV 2023 pour tous les élèves de 5ème des collèges concernés. Les représentants de l'autorité parentale doivent donner leur accord écrit.
------------------------------	--

Vers quel professionnel de santé se tourner ? Depuis le décret du 8 août 2023, sont autorisés à prescrire (sous condition de formation) et à administrer le vaccin HPV :

- le médecin généraliste,
- le/la pharmacien,
- l'infirmier(e),
- le/la biologiste médical(e) en laboratoire d'analyse,
- le/la sage-femme.

LES AUTRES GESTES RECOMMANDÉS

Lors des rapports oro-génitaux, certains gestes de prévention sont recommandés pour limiter une infection HPV :

- l'utilisation du préservatif pour se protéger de toute forme d'IST,
- préconiser un bon état gingival évitant le passage des germes à travers les gencives pour garantir une bonne santé.

Il est aussi fortement conseillé de réaliser un dépistage pour repérer une lésion précancéreuse génitale chez la femme. A partir de 30 ans lors de la réalisation d'un frottis, il y a une recherche systématique du HPV par biologie moléculaire (PCR). L'analyse du frottis peut être prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie lors de la réception du courrier du centre de dépistage.

Actuellement le HPV ne fait pas l'objet d'un dépistage primaire au niveau oral. Ce ne sont que les signes cliniques et symptomatologiques qui permettent un repérage.

Les gestes de recommandation associés à la vaccination protègent efficacement de la contamination et favorisent une éducation sur la santé sexuelle.

Quand consulter ?

Lorsque l'un ou plusieurs des symptômes ci-dessous persistent au delà de 2/3 semaines :

- adénopathies cervicales,
- douleur dans la gorge,
- difficultés de déglutition,
- gêne lors de l'élocution,
- extinction de voix,
- présence de lésions suspectes sur la langue ou sur la face interne de la joue.

Vous êtes professionnel de santé, vous avez votre rôle à jouer. Vos URPS d'Occitanie vous recommandent d'en parler avec vos patients.

BIBLIOGRAPHIE

Sites d'information :

<https://www.ameli.fr/haute-garonne/assure/sante/themes/cancer-col-uterus/frottis-hpv-depistage>

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/gyneco-le-depistage-du-cancerdu-col-de-luterus_Array.pdf

[Vaccination contre les papillomavirus humains \(HPV\) | ameli.fr | Médecin](#)

<https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancers-de-la-sphere-ORL-voies-aerodigestives-superieures/Le-bilan-initial#toc-qu-est-ce-que-le-bilan-diagnostique->

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3192618/fr/depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus-le-test-hpv-hr-ecommande-chez-les-femmes-de-plus-de-30-ans

[IST, qu'est-ce que ça veut dire ? \(questionsexualite.fr\)](#)

[L'Australie sur le point d'éradiquer le cancer du col de l'utérus \(lefigaro.fr\)](#)

Micheau A, Hoa D, e-Anatomy, www.imaios.com, DOI: 10.37019/e-anatomy

[oropharynx-papillomavirus-2014.pdf \(gustaveroussy.fr\)](#)

[Papillomavirus: 7 raisons de vacciner aussi les garçons \(lefigaro.fr\)](#)

[Savoir reconnaître les symptômes des cancers ORL HPV, pour mieux les soigner \(francetvinfo.fr\)](#)

[Ou'est-ce que les voies aérodigestives supérieures \(VADS\) ? Définition - Cancers de la sphère ORL \(voies aérodigestives supérieures\) \(e-cancer.fr\)](#)

[Vaccination contre les cancers HPV - Infections \(e-cancer.fr\)](#)

[Vaccination contre les papillomavirus humains \(HPV\) | ameli.fr | Médecin](#)

Textes juridiques :

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047948973>

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047949019>

Vidéo:

[Vidéos Bing](#)